

# ブルーベリー 営利栽培のポイント

	ノーザンハイブッシュ	サザンハイブッシュ	ラビットアイ
栽培適地	北海道、本州、四国、九州 地方の比較的涼しい地域	東北地方から、九州、 沖縄まで	東北地方から、九州、 鹿児島まで
耐暑性	弱い	非常に強い	非常に強い
耐寒性	非常に強い	強い	中程度ある
耐干性	弱い	弱～中程度ある	強い
植え付け土壌	ph4.8～5.5の酸性土壌 を好む(多めのピートモ スを土と混ぜる)	ph4.8～5.5の酸性土壌 を好む(多めのピートモ スを土と混ぜる)	ph5.2～5.6の弱酸性土 壌を好む(少しのピート モスを土と混ぜる)
苗木の植え付け時期	11月～3月頃	11月～3月頃	11月～3月頃
植え付け間隔	1～1.5m	1～1.5m	1.8～2.5m
収穫時期	5月下旬～8月中旬	5月中旬～7月中旬	6月中旬～9月下旬
果実収量(成木)	約2～4kg	約2～4kg	約5～10kg
受粉	ほとんど自家受粉しま すが、収量アップのため に、ミツバチ、マルハナ バチ等の導入をおすす めします	自家受粉、他家受粉問 わずに収量アップのため にミツバチ、マルハナ バチ等の導入をおすす めします	ほとんど他家受粉 収量アップのためにミ ツバチ、マルハナバチ 等の導入をおすすめし ます
施肥	低度化成肥料(8-8-8)等 を3月、6月、9月に適 度に与える。 成木になったら少な めに与える。	低度化成肥料(8-8-8)等 を3月、6月、9月に適 度に与える。 成木になったら少な めに与える。	若木の時は低度化成肥 料(8-8-8)等を与える が成木になったら肥料 はほとんど与えない方 が良い。
防鳥対策	20mm目の防鳥ネット で株、または圃場全 体を囲う	20mm目の防鳥ネット で株、または圃場全 体を囲う	20mm目の防鳥ネット で株、または圃場全 体を囲う(防鳥ネット なしでもハイブッシュ ほどの被害はない。)

※成木とは7年以上の樹

## 海外生まれのハイブッシュブルーベリー

ハイブッシュブルーベリーは水分を多く必要とします。  
海外では高畦仕立、点滴灌水栽培が基本です。

